

二十二、茄科果菜類薊馬類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
20%覆滅蟎 水溶性粉劑* (Formetanate)	1.3-3.8 公斤	400	害蟲發生時施藥一次。	1.採收前9天停止施藥。 2.提高使用濃度可能引起藥害。
10%賽滅寧 可濕性粉劑* (Cypermethrin)	0.2-0.5 公斤	3,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，水域禁用。
5%賽滅寧 可濕性粉劑* (Cypermethrin)	0.3-1 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，水域禁用。
5%賽滅寧 水基乳劑* (Cypermethrin)	0.3-1 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，水域禁用。
5%賽滅寧 微乳劑* (Cypermethrin)	0.3-1 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，水域禁用。
5%賽滅寧乳劑* (Cypermethrin)	0.3-1 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，水域禁用。

*延伸使用藥劑