

二十四、番茄銀葉粉蝨【參照花椰菜銀葉粉蝨】

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
40.4%賽果培水懸劑 (Thiacloprid)	0.4-0.6公升	3,300	害蟲發生時開始施藥，每隔7天施藥一次。	1.採收前10天停止施藥。 2.具中等呼吸急毒性。
20%達特南水溶性粒劑 (Dinotefuran)	0.4-0.6公斤	3,000	害蟲發生時開始施藥，每隔7天施藥一次。	1.採收前3天停止施藥。 2.具中等呼吸急毒性；對蜜蜂劇毒。
10.4%貝賽益達胺水懸劑 (Beta-cyfluthrin + Imidacloprid)	0.5公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，每隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對水生物具毒性，勿使用於「飲用水水源水質保護區」及「飲用水取水口一定距離內之地區」。
20%亞滅培水溶性粉劑 (Acetamiprid)	0.2-0.25公斤	4,000	害蟲發生時，每隔7天施藥一次。	1.本藥劑試驗時加展著劑「組展」3,000倍。 2.採收前3天停止施藥。

TACTRI