

## 二十九、茄子二點小綠葉蟬（浮塵子）

學名：*Amrasca biguttula* (Ishida)

英名：Two-spotted small green leafhopper

危害作物：茄科、豆類、棉、麻……等。

生活習性：

一年發生八至十四世代，成蟲產卵於嫩莖、葉柄及葉脈組織內，卵孵化後，若蟲與成蟲棲息葉背以刺吸式口器吸食葉液。

危害特徵：

被害嫩芽捲縮不展，葉片先由邊緣呈淡黃色，以後逐漸向下皺縮枯萎，發生嚴重致使植株衰弱，開花結果不良。

防治方法：

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
24.7%(w/v)賽速洛寧膠囊水懸混劑 (Thiamethoxam + Lambda-cyhalothrin)	0.3-0.4 公升	4,000	害蟲發生初期開始施藥，每隔7天噴藥一次，連續3次。	1.採收前6天停止施藥。 2.具口服及呼吸中等毒。
1.5%伽瑪賽洛寧膠囊懸著液 (Gamma-cyhalothrin)	0.25-0.5 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，每隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對水生物劇毒，勿使用於「飲用水水源水質保護區」及「飲用水取水口一定距離內之地區」。
2%阿巴汀乳劑 (Abamectin)	0.25-0.5 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，每隔7天施藥一次。	採收前3天停止施藥。
2%阿巴汀水基乳劑 (Abamectin)	0.25-0.5 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，每隔7天施藥一次。	採收前3天停止施藥。
2.8%畢芬寧乳劑 (Bifenthrin)	0.5-1.0 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，每隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
2.5%畢芬寧水懸劑 (Bifenthrin)	0.5-1.0 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，每隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
20%覆滅蟎水溶性粉劑 (Formetanate)	1.25-2.5 公斤	400	害蟲發生時開始施藥，每隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
10%百滅寧乳劑 (Permethrin)	0.5-1.0 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，每隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
25%丁基加保扶可濕性粉劑 (Carbosulfan)	1.2-1.7 公斤	700	每隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。