

三十、茄子薊馬類

學名、英名及生活習性與危害特徵與西瓜南黃薊馬同。

防治方法：任選下表一種藥劑防除

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
7.8%克凡洛寧 水懸劑 (Chlorfenapyr + lambda-cyhalothrin)	0.25-0.5 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，隔7天再施藥一次。	1.採收前6天(設施栽培12天)停止施藥。 2.具中等口服急毒性、強烈呼吸急毒性、輕微眼睛刺激性、輕微皮膚刺激性。 3.對水生物具毒性，勿使用於「飲用水水源水質保護區」及「飲用水取水口一定距離內之地區」。
50%滅賜克 可濕性粉劑 (Methiocarb)	1.2-1.4 公斤	800	害蟲發生初期開始施藥，每隔7天噴藥一次，連續3次。	1.防治南黃薊馬。 2.採收前15天停止施藥。 3.具口服中等毒、呼吸劇毒及中度眼刺激性。
9.6%益達胺溶液 (Imidacloprid)	0.5-0.75 公升	2,000	害蟲發生時施藥防治。	1.防治南黃薊馬。 2.採收前6天停止施藥。
35%白克松 可濕性粉劑 (Pyraclofos)	1-1.2 公斤	1,000	薊馬發生時施藥，每隔7天施藥一次。	1.防治南黃薊馬。 2.採收前10天停止施藥。
2.8%第滅寧 水基乳劑 (Deltamethrin)	1-1.5 公升	1,000	薊馬開始發生時，施藥一次。	1.防治南黃薊馬。 2.採收前12天停止施藥。
2.8%第滅寧乳劑 (Deltamethrin)	1-1.5 公升	1,000	薊馬開始發生時，施藥一次。	1.防治南黃薊馬。 2.採收前12天停止施藥。
10%百滅寧 可濕性粉劑 (Permethrin)	1-1.5 公斤	1,000	薊馬開始發生時，施藥一次。	1.防治南黃薊馬。 2.採收前3天停止施藥。
10%百滅寧乳劑 (Permethrin)	1-1.5 公升	1,000	薊馬開始發生時，施藥一次。	1.防治南黃薊馬。 2.採收前6天停止施藥。
20%覆滅蟎 水溶性粉劑 (Formetanate)	2.5-3.75 公升	400	薊馬開始發生時，施藥一次。	1.防治南黃薊馬。 2.採收前9天停止施藥。
40%必芬松乳劑 (Pyridaphen- thion)	1-1.5 公升	800	薊馬開始發生時，施藥一次。	1.防治南黃薊馬。 2.採收前6天停止施藥。

亦可參考茄科果菜類薊馬類