

三十一、茄子二點葉蟎【參照胡瓜二點葉蟎】

防除方法：任選下表一種藥劑防除

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
2%阿巴汀乳劑 (Abamectin)	0.5-0.6 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，每隔7天施藥一次。	採收前3天停止施藥。
2%阿巴汀水基乳劑 (Abamectin)	0.5-0.6 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，每隔7天施藥一次。	採收前3天停止施藥。
20%畢達本 可濕性粉劑 (Pyridaben)	0.2-0.7 公斤	3,000	害蟎發生時開始施藥，隔7天施藥一次。	1.採收前12天(設施栽培18天)停止施藥。 2.具中度眼刺激性;對蜜蜂毒性高;對水生物劇毒，勿使用於「飲用水水源水質保護區」及「飲用水取水口一定距離內之地區」。
20%畢達本水懸劑 (Pyridaben)	0.2-0.7 公升	3,000	害蟎發生時開始施藥，隔7天施藥一次。	1.採收前12天(設施栽培18天)停止施藥。 2.具中度眼刺激性;對蜜蜂毒性高;對水生物劇毒，勿使用於「飲用水水源水質保護區」及「飲用水取水口一定距離內之地區」。
1%密滅汀乳劑 (Milbemectin)	0.6-0.8 公升	1,500	葉蟎發生時，每7天施藥一次，連續二次。	採收前3天停止施藥。
2.8%畢芬寧乳劑 (Bifenthrin)	0.6-0.8 公升	1,500	葉蟎發生時開始施藥，隔7天再施藥一次。	採收前6天停止施藥。
2.5%畢芬寧水懸劑 (Bifenthrin)	0.6-0.8 公升	1,500	葉蟎發生時開始施藥，隔7天再施藥一次。	採收前6天停止施藥。
2.5%賽洛寧微乳劑 (lambda- Cyhalothrin)	0.6-1.2 公升	1,000	葉蟎發生時開始施藥，隔7天再施藥一次。	採收前6天停止施藥。
2.46%賽洛寧 膠囊懸著液 (lambda- Cyhalothrin)	0.6-1.2 公升	1,000	葉蟎發生時開始施藥，隔7天再施藥一次。	採收前6天停止施藥。
2.8%賽洛寧乳劑 (lambda- Cyhalothrin)	0.6-1.2 公升	1,000	葉蟎發生時開始施藥，隔7天再施藥一次。	採收前6天停止施藥。
2.8%賽洛寧水懸劑 (lambda- Cyhalothrin)	0.6-1.2 公升	1,000	葉蟎發生時開始施藥，隔7天再施藥一次。	採收前6天停止施藥。