

四十七、秋葵粉蝨類

防治方法：

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
150g/L 賜派滅水分散性油懸劑* (Spirotetramat)	0.3-1.3 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前7天停止施藥。
11%百利普芬乳劑* (Pyriproxyfen)	0.8-2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前7天停止施藥。
11%百利普芬水基乳劑* (Pyriproxyfen)	0.8-2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前7天停止施藥。
11%百利普芬水懸劑* (Pyriproxyfen)	0.8-2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前7天停止施藥。
100g/L賜派滅水懸劑* (Spirotetramat)	0.4-2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天再施一次。	採收前7天停止施藥。
20%達特南水溶性粒劑* (Dinotefuran)	0.2-0.7 公斤	3,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前3天停止施藥。
40.4%賽果培水懸劑* (Thiacloprid)	0.2-0.6 公升	3,300	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
20%亞滅培水溶性粉劑* (Acetamiprid)	0.1-0.5 公斤	4,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥，設施栽培採收前12天停止施藥。
10.4%貝賽益達胺水懸劑* (Beta-cyfluthrin+ Imidacloprid)	0.3-1 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。

*延伸使用藥劑