

四十九、秋葵葉部薊馬類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
2.5%賽洛寧微乳劑* (Lambda-cyhalothrin)	0.3-1 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
2.46%賽洛寧 膠囊懸著劑* (Lambda-cyhalothrin)	0.3-1 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
2.8%賽洛寧乳劑* (Lambda-cyhalothrin)	0.3-1 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
2.8%賽洛寧水懸劑* (Lambda-cyhalothrin)	0.3-1 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
50%滅賜克 可濕性粉劑* (Methiocarb)	0.6-2.5 公斤	800	害蟲發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前15天停止施藥。
20%亞滅培 水溶性粉劑* (Acetamiprid)	0.1-0.5 公斤	4,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥，設施栽培採收前12天停止施藥。
9.6%益達胺溶液* (Imidacloprid)	0.3-1 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
9.6%益達胺水懸劑* (Imidacloprid)	0.3-1 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
2.9%貝他-賽扶寧 乳劑* (Beta-cyfluthrin)	0.3-1.3 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
43%佈飛松乳劑* (Profenofos)	0.6-2.5 公升	800	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
25%福化利乳劑* (tau-Fluvalinate)	0.2-0.7 公升	3,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前7天停止施藥。

*延伸使用藥劑

