

五十五、洛神葵鱗翅目害蟲

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
10%芬化利乳劑* (Fenvalerate)	0.4-2 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
20%芬化利乳劑* (Fenvalerate)	0.1-0.7 公升	3,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
20%芬化利水基乳劑* (Fenvalerate)	0.1-0.7 公升	3,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
20%芬化利可濕性粉劑* (Fenvalerate)	0.1-0.7 公斤	3,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
5%芬化利乳劑* (Fenvalerate)	0.5-2.7 公升	750	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
2.5%畢芬寧水懸劑* (Bifenthrin)	0.4-2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
2.8%畢芬寧乳劑* (Bifenthrin)	0.4-2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
34%硫敵克水懸劑* (Thiodicarb)	0.4-1.2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
75%硫敵克可濕性粉劑* (Thiodicarb)	0.2-0.5 公斤	2,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。

*延伸使用藥劑