

## 五十六、洛神葵蚜蟲類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
2.5%畢芬寧水懸劑 (Bifenthrin)	0.6-1.2 公升	1,000	蚜蟲發生初期全株施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.注意藥液需噴及新梢處。 3.具呼吸劇毒。
40.8%陶斯松乳劑 (Chlorpyrifos)	0.6-1.2 公升	1,000	蚜蟲發生初期全株施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.注意藥液需噴及新梢處。 3.具口服及呼吸中等毒、對皮膚具中度刺激性。 4.對水生物具毒性。
9.6%益達胺溶液 (Imidacloprid)	0.3-0.6 公升	2,000	蚜蟲發生初期全株施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.注意藥液需噴及新梢處。 3.對水生生物中等毒；對蜜蜂毒性高。
2.8%畢芬寧乳劑* (Bifenthrin)	0.4-0.8 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
2.5%畢芬寧水懸劑* (Bifenthrin)	0.4-0.8 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
2.8%畢芬寧乳劑* (Bifenthrin)	0.4-2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.注意藥液需噴及新梢處。 2.採收前6天停止施藥。
2.5%畢芬寧水懸劑* (Bifenthrin)	0.4-2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.注意藥液需噴及新梢處。 2.採收前6天停止施藥。
10%賽速安水溶性粒劑* (Thiamethoxam)	0.3-0.6 公斤	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
25%賽速安水溶性粒劑* (Thiamethoxam)	0.1-0.2 公斤	5,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。

\*延伸使用藥劑