

五十七、洛神葵夜蛾類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
18.4%剋安勃 水懸劑 (Chlorantraniliprole)	0.2-0.5 公升	2,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
35%剋安勃 水分散性粒劑 (Chlorantraniliprole)	0.1-0.2 公斤	5,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
5%賽滅寧乳劑 (Cypermethrin)	0.4-0.8 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，水域禁用。
5%賽滅寧 水基乳劑 (Cypermethrin)	0.4-0.8 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，水域禁用。
5%賽滅寧微乳劑 (Cypermethrin)	0.4-0.8 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，水域禁用。
10%賽滅寧 可濕性粉劑 (Cypermethrin)	0.2-0.4 公斤	3,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，水域禁用。
5%賽滅寧 可濕性粉劑 (Cypermethrin)	0.4-0.8 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，水域禁用。
2.4%第滅寧水懸劑* (Deltamethrin)	0.4-2.0 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前12天停止施藥。
2.8%第滅寧乳劑* (Deltamethrin)	0.4-2.0 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前12天停止施藥。
2.8%第滅寧 水基乳劑* (Deltamethrin)	0.4-2.0 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前12天停止施藥。
58%乃力松乳劑* (Naled)	0.5-1 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前4天停止施藥。
25%二福隆 可濕性粉劑* (Diflubenzuron)	0.4-0.6 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前7天停止施藥。
5%可芬諾水懸劑* (Chromafenozide)	0.6-1.2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前7天停止施藥。
40%納乃得 水溶性粒劑* (Methomyl)	0.4-0.8 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前7天停止施藥。
25%納乃得 水溶性粉劑* (Methomyl)	0.8-1.5 公斤	800	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前7天停止施藥。

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
40%納乃得 水溶性粉劑* (Methomyl)	0.4-0.8 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	採收前7天停止施藥。
40%納乃得 水溶性粉劑- 水溶性袋裝* (Methomyl)	0.4-0.8 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	採收前7天停止施藥。
50%馬拉松乳劑* (Malathion)	2公升	500	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	採收前7天停止施藥。
2.46%賽洛寧 膠囊懸著液* (lambda- Cyhalothrin)	0.5-1 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
2.5%賽洛寧微乳劑* (lambda- Cyhalothrin)	0.5-1 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
2.8%賽洛寧乳劑* (lambda- Cyhalothrin)	0.5-1 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
2.8%賽洛寧水懸劑* (lambda- Cyhalothrin)	0.5-1 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。

*延伸使用藥劑