

一百三十一、 薤菜金花蟲類、象鼻蟲類

| 藥劑名稱 | 每公頃每次施藥量 | 稀釋倍數(倍) | 施藥方法 | 注意事項 |
|---|---------------|---------|----------------------------|---|
| 20%達特南 水溶性粒劑* (Dinotefuran) | 0.1-0.3 公斤 | 3,000 | 害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 採收前7天停止施藥。 |
| 20%亞滅培 水溶性粉劑* (Acetamiprid) | 0.1-0.5 公斤 | 2,000 | 害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 採收前9天停止施藥。 |
| 43%佈飛松乳劑* (Profenofos) | 0.3-1 公升 | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天噴藥一次，連續三次。 | 1.採收前12天停止施藥。 2.具中度眼刺激性、強皮膚刺激性。 3.對水生物具毒性，勿使用於「飲用水水源水質保護區」及「飲用水取水口一定距離內之地區」。 4.對蜜蜂具微毒性 |
| 50%培丹 水溶性粉劑* (Cartap hydrochloride) | 0.3-1 公斤 | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天噴藥一次。 | 採收前10天停止施藥。 |

*延伸使用藥劑