

一百三十六、繖形花科小葉菜類蚜蟲類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
2.4%第滅寧水懸劑* (Deltamethrin)	0.3-3.0 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
2.8%第滅寧乳劑* (Deltamethrin)	0.3-3.0 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
2.8%第滅寧水基乳劑* (Deltamethrin)	0.3-3.0 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
40%納乃得水溶性粉劑* (Methomyl)	0.1-0.8 公斤	1,500	蟲害發生時開始施藥，必要時每隔7天施藥一次。	採收前4天停止施藥。
40%納乃得水溶性粉劑-水溶性袋裝* (Methomyl)	0.1-0.8 公斤	1,500	蟲害發生時開始施藥，必要時每隔7天施藥一次。	採收前4天停止施藥。
40%納乃得水溶性粒劑* (Methomyl)	0.1-0.8 公斤	1,500	蟲害發生時開始施藥，必要時每隔7天施藥一次。	採收前4天停止施藥。
25%納乃得水溶性粉劑* (Methomyl)	0.2-1.2 公斤	1,000	蟲害發生時開始施藥，必要時每隔7天施藥一次。	採收前4天停止施藥。
9.6%益達胺水懸劑* (Imidacloprid)	0.1-0.2 公升	4,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前9天停止施藥。 2.避免施用於弱勢苗，以免發生藥害。 3.對蜜蜂具毒性，避免開花時使用。
9.6%益達胺溶液* (Imidacloprid)	0.1-0.2 公升	4,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前9天停止施藥。 2.避免施用於弱勢苗，以免發生藥害。 3.對蜜蜂具毒性，避免開花時使用。
18.2%益達胺水懸劑* (Imidacloprid)	0.03-0.1 公升	8,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前9天停止施藥。 2.避免施用於弱勢苗，以免發生藥害。 3.對蜜蜂具毒性，避免開花時使用。
28.8%益達胺溶液* (Imidacloprid)	0.02-0.08 公升	12,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前9天停止施藥。 2.避免施用於弱勢苗，以免發生藥害。 3.對蜜蜂具毒性，避免開花時使用。

*延伸使用藥劑

