

一百三十七、繖形花科小葉菜類夜蛾類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
58%乃力松乳劑* (Naled)	0.5-1 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前4天停止施藥。
25%二福隆 可濕性粉劑* (Diflubenzuron)	0.4-0.6 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前14天停止施藥。
40%納乃得 水溶性粒劑* (Methomyl)	0.2-2 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前4天停止施藥。
25%納乃得 水溶性粉劑* (Methomyl)	0.3-3.8 公斤	800	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前4天停止施藥。
40%納乃得 水溶性粉劑* (Methomyl)	0.2-2 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前4天停止施藥。
40%納乃得 水溶性粉劑- 水溶性袋裝* (Methomyl)	0.2-2 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前4天停止施藥。
50%培丹 水溶性粉劑* (Cartap hydrochloride)	0.3-3 公斤	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
2.15%因滅汀乳劑* (Emamectin benzoate)	0.2-2 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止用藥。
2.15%因滅汀 水基乳劑* (Emamectin benzoate)	0.2-2 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止用藥。
19.2g/L因滅汀 乳劑* (Emamectin benzoate)	0.2-2 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止用藥。
5%因滅汀乳劑* (Emamectin benzoate)	0.1-0.6 公升	5,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止用藥。
5%因滅汀 水溶性粒劑* (Emamectin benzoate)	0.1-0.6 公斤	5,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止用藥。
10%賽滅寧 可濕性粉劑* (Cypermethrin)	0.1-1 公斤	3,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，水域禁用。

藥劑名稱	每公頃每 次施藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥方法	注意事項
5%賽滅寧 可濕性粉劑* (Cypermethrin)	0.2-2 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，水域禁 用。
5%賽滅寧 水基乳劑* (Cypermethrin)	0.2-2 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，水域禁 用。
5%賽滅寧 微乳劑* (Cypermethrin)	0.2-2 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，水域禁 用。
5%賽滅寧乳劑* (Cypermethrin)	0.2-2 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，水域禁 用。

\*延伸使用藥劑

TACTRI