

## 一百四十、芹菜蚜蟲類

防治方法：任選下表一種藥劑防除

| 藥劑名稱   | 每公頃每次施藥量        | 稀釋倍數(倍) | 施藥方法                  | 注意事項  |
|--|-----------------|---------|-----------------------|---|
| 10%賽速安<br>水溶性粒劑*<br>(Thiamethoxam)                                 | 0.1-1.5<br>公斤   | 2,000   | 害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 採收前6天停止施藥。  |
| 21.8%速殺氟<br>水懸劑*<br>(Sulfoxaflor)                                  | 0.04-0.13<br>公升 | 6,000   | 害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天再施一次。 | 採收前6天停止施藥。  |
| 20%達特南<br>水溶性粒劑*<br>(Dinotefuran)                                  | 0.1-0.5<br>公斤   | 2,000   | 害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 採收前7天停止施藥。  |
| 24.7%賽速洛寧<br>膠囊水懸混劑*<br>(Thiamethoxam +<br>lambda-<br>cyhalothrin) | 0.1-0.2<br>公升   | 4,000   | 害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 採收前6天(設施栽培12天)停止施藥。   |
| 16%可尼丁<br>水溶性粒劑*<br>(Clothianidin)                                 | 0.06-0.25<br>公斤 | 4,000   | 害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 採收前9天(設施栽培15天)停止施藥。   |
| 20%亞滅培<br>水溶性粉劑*<br>(Acetamiprid)                                  | 0.04-0.2<br>公斤  | 6,000   | 害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 採收前9天停止施藥。  |
| 25%賽速安<br>水溶性粒劑*<br>(Thiamethoxam)                                 | 0.1-0.2<br>公斤   | 5,000   | 害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 1.採收前6天停止施藥。<br>2.具中等呼吸急毒性；對鳥類具中等毒性；對蜜蜂具中到輕度毒性。             |
| 1%密滅汀乳劑*<br>(Milbemectin)  | 0.2-0.7<br>公升   | 1,500   | 害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 1.採收前6天停止施藥。<br>2.對水生物劇毒，勿使用於「飲用水水源水質保護區」及「飲用水取水口一定距離內之地區」。 |
| 18.2%益達胺<br>水懸劑*<br>(Imidacloprid)                                 | 0.03-0.1<br>公升  | 8,000   | 害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 採收前9天停止施藥。  |
| 50%賽達松乳劑*<br>(Phenthoate)  | 0.3-1<br>公升     | 1,000   | 害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 採收前15天停止施藥。   |
| 50%培丹<br>水溶性粉劑*<br>(Cartap<br>hydrochloride)                       | 0.3-1<br>公斤     | 1,000   | 害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 採收前10天停止施藥。   |
| 2.8%第滅寧<br>水基乳劑*<br>(Deltamethrin)                                 | 0.3-1<br>公升     | 1,000   | 害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 採收前6天停止施藥。  |

| 藥劑名稱                           | 每公頃每次施藥量       | 稀釋倍數(倍) | 施藥方法                  | 注意事項        |
|--------------------------------|----------------|---------|-----------------------|-------------|
| 2.8%第滅寧乳劑*<br>(Deltamethrin)   | 0.3-1<br>公升    | 1,000   | 害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 採收前6天停止施藥。  |
| 2.4%第滅寧水懸劑*<br>(Deltamethrin)  | 0.3-1<br>公升    | 1,000   | 害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 採收前6天停止施藥。  |
| 20%免扶克乳劑*<br>(Benfuracarb)     | 0.5-2<br>公升    | 500     | 害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 採收前12天停止施藥。 |
| 25%免扶克可濕性粉劑*<br>(Benfuracarb)  | 0.4-1.4<br>公斤  | 700     | 害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 採收前12天停止施藥。 |
| 40%免扶克水懸劑*<br>(Benfuracarb)    | 0.3-1.0<br>公升  | 1,000   | 害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 採收前12天停止施藥。 |
| 31.6%護賽寧乳劑*<br>(Flucythrinate) | 0.03-0.1<br>公升 | 8,500   | 害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 採收前15天停止施藥。 |

\*延伸使用藥劑