

一百四十一、芹 菜 夜 蛾 類

夜蛾類：包括斜紋夜蛾、甜菜夜蛾、番茄夜蛾、擬尺蠖等害蟲。

防治方法：

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
18.4%剋安勃 水懸劑 (Chlorantraniliprole)	0.1-1.2 公升	2,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
35%剋安勃 水分散性粒劑 (Chlorantraniliprole)	0.1-0.6 公斤	5,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
5%賽滅寧乳劑 (Cypermethrin)	0.2-2 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，水域禁用。
5%賽滅寧 水基乳劑 (Cypermethrin)	0.2-2 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，水域禁用。
5%賽滅寧微乳劑 (Cypermethrin)	0.2-2 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，水域禁用。
10%賽滅寧 可濕性粉劑 (Cypermethrin)	0.1-1 公斤	3,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，水域禁用。
5%賽滅寧 可濕性粉劑 (Cypermethrin)	0.2-2 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，水域禁用。
33%佈飛百滅寧 乳劑* (Profenofos + Permethrin)	0.8-1 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
5%可芬諾水懸劑* (Chromafenozide)	0.3-3 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前14天停止施藥。
25%汰芬隆 水懸劑* (Diafenthiuron)	1-1.5 公升	750	害蟲發生時開始施藥，每隔7天施藥一次。	1.採收前14天停止施藥。 2.高溫多濕條件下可能發生藥害，避免在溫室設施隧道栽培時使用
20%芬化利 水基乳劑* (Fenvalerate)	0.15- 0.25公升	3,000	害蟲發生時開始施藥，每隔7天施藥一次。	採收前14天停止施藥。
20%芬化利乳劑* (Fenvalerate)	0.15- 0.25公升	3,000	害蟲發生時開始施藥，每隔7天施藥一次。	採收前14天停止施藥。
20%芬化利 可濕性粉劑* (Fenvalerate)		5,000	害蟲發生時開始施藥，每隔7至10天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
5%芬化利乳劑* (Fenvalerate)	0.5公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，每隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
2.46%賽洛寧 膠囊懸著液* (lambda-Cyhalothrin)	0.5-1 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥， 每隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
2.5%賽洛寧 微乳劑* (lambda-Cyhalothrin)	0.5-1 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥， 每隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
2.8%賽洛寧乳劑* (lambda-Cyhalothrin)	0.5-1 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥， 每隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
2.8%賽洛寧水懸劑* (lambda-Cyhalothrin)	0.5-1 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥， 每隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
50%馬拉松乳劑* (Malathion)	1.0-1.2 公升	500	害蟲發生時開始施藥， 每隔5至7天施藥一次。	採收前4天停止施藥。
35%白克松 可濕性粉劑* (Pyraclofos)	0.25-0.5 公斤	3,000	害蟲發生時開始施藥， 每隔7天施藥一次。	採收前15天停止施藥。
75%硫敵克 可濕性粉劑* (Thiodicarb)	0.3-0.5 公斤	3,000	害蟲發生時開始施藥， 每隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.避免與石灰硫磺合劑、波爾多液、重金屬系藥劑混用。

*延伸使用藥劑