

一百五十七、菠菜夜蛾類

【參照甜菜夜蛾；番茄夜蛾】

夜蛾類：包括斜紋夜蛾、甜菜夜蛾、番茄夜蛾、擬尺蠖等害蟲。

防治方法：

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
10%克凡派水懸劑 (Chlorfenapyr)	0.8-1.0 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥， 每隔7天施藥一次。	1.採收前12天停止施藥。 2.具口服、皮膚及呼吸中等 毒性。 3.對鳥類、蜜蜂毒性高。 4.對水生物劇毒，勿使用於 「飲用水水源水質保護 區」及「飲用水取水口一 定距離內之地區」。
5%克福隆乳劑 (Chlorfluazuron)	0.8-1.0 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥， 每隔7天施藥一次。	1.採收前12天停止施藥。 2.具眼刺激性。
48.1%蘇力菌 水分散性粒劑 35000 DBMU/mg (<i>Bacillus thuringiensis</i>)	0.8-1.0 公斤	1,000	害蟲發生時開始施藥， 每隔7天施藥一次。	
25%汰芬隆 水懸劑* (Diafenthiuron)	1-1.5 公升	750	害蟲發生時開始施藥， 每隔7天施藥一次。	1.採收前14天停止施藥。 2.高溫多濕條件下可能發 生藥害，避免在溫室設施 、隧道栽培時使用
2.46%賽洛寧 膠囊懸著液* (lambda-Cyhalothrin)	0.5-1 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥， 每隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
2.5%賽洛寧 微乳劑* (lambda-Cyhalothrin)	0.5-1 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥， 每隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
2.8%賽洛寧乳劑* (lambda-Cyhalothrin)	0.5-1 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥， 每隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
2.8%賽洛寧水懸劑* (lambda-Cyhalothrin)	0.5-1 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥， 每隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
50%馬拉松乳劑* (Malathion)	1.0-1.2 公升	500	害蟲發生時開始施藥， 每隔5至7天施藥一次。	採收前4天停止施藥。
35%白克松 可濕性粉劑* (Pyraclofos)	0.25-0.5 公斤	3,000	害蟲發生時開始施藥， 每隔7天施藥一次。	採收前15天停止施藥。
33%佈飛百滅寧* 乳劑 (Profenofos + Permethrin)	0.8-1 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥， 每隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。

*延伸使用藥劑

