

## 一百六十一、莧科小葉菜類蚜蟲類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
2.4%第滅寧水懸劑* (Deltamethrin)	0.3-1.0 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
2.8%第滅寧乳劑* (Deltamethrin)	0.3-1.0 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
2.8%第滅寧 水基乳劑* (Deltamethrin)	0.3-1.0 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
40%納乃得 水溶性粉劑* (Methomyl)	0.6-0.8 公斤	1,500	蟲害發生時開始施藥，必要時每隔7天施藥一次。	採收前4天停止施藥。
40%納乃得 水溶性粉劑- 水溶性袋裝* (Methomyl)	0.6-0.8 公斤	1,500	蟲害發生時開始施藥，必要時每隔7天施藥一次。	採收前4天停止施藥。
40%納乃得 水溶性粒劑* (Methomyl)	0.6-0.8 公斤	1,500	蟲害發生時開始施藥，必要時每隔7天施藥一次。	採收前4天停止施藥。
25%納乃得 水溶性粉劑* (Methomyl)	0.6-0.8 公斤	1,000	蟲害發生時開始施藥，必要時每隔7天施藥一次。	採收前4天停止施藥。

\*延伸使用藥劑