

## 一百六十七、莧菜夜蛾類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
33%佈飛百滅寧乳劑* (Profenofos + Permethrin)	0.8-1 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
5%因滅汀水溶性粒劑* (Emamectin benzoate)	0.06 -0.2 公斤	5,000	害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
2.15%因滅汀乳劑* (Emamectin benzoate)	0.2-0.5 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
50%培丹水溶性粉劑* (Cartap hydrochloride)	0.3-1 公斤	1,000	害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
40%納乃得水溶性粒劑* (Methomyl)	0.2-0.7 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。	採收前4天停止施藥。
25%納乃得水溶性粉劑* (Methomyl)	0.4-1.3 公斤	800	害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。	採收前4天停止施藥。
40%納乃得水溶性粉劑* (Methomyl)	0.2-0.7 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。	採收前4天停止施藥。
40%納乃得水溶性粉劑-水溶性袋裝* (Methomyl)	0.2-0.7 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。	採收前4天停止施藥。
5%可芬諾水懸劑* (Chromafenozide)	0.3-1 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。	採收前14天停止施藥。
18.4%剋安勃水懸劑* (Chlorantraniliprole)	0.1-0.4 公升	2,500	害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
35%剋安勃水分散性粒劑* (Chlorantraniliprole)	0.06-0.2 公斤	5,000	害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。

\*延伸使用藥劑