

一百六十九、莧菜螟蛾類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
50%培丹 水溶性粉劑* (Cartap hydrochloride)	0.3-1 公斤	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
40%納乃得 水溶性粒劑* (Methomyl)	0.2-0.7 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前4天停止施藥。
25%納乃得 水溶性粉劑* (Methomyl)	0.4-1.3 公斤	800	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前4天停止施藥。
40%納乃得 水溶性粉劑* (Methomyl)	0.2-0.7 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前4天停止施藥。
40%納乃得 水溶性粉劑- 水溶性袋裝* (Methomyl)	0.2-0.7 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前4天停止施藥。
5%可芬諾水懸劑* (Chromafenozide)	0.3-1 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前14天停止施藥。

*延伸使用藥劑