

## 一百七十一、山蘇鱗翅目害蟲

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
10%芬化利乳劑* (Fenvalerate)	0.2-0.7 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
20%芬化利乳劑* (Fenvalerate)	0.1-0.3 公升	3,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
20%芬化利 水基乳劑* (Fenvalerate)	0.1-0.3 公升	3,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
20%芬化利 可濕性粉劑* (Fenvalerate)	0.1-0.3 公斤	3,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
5%芬化利乳劑* (Fenvalerate)	0.3-1.3 公升	750	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
34%硫敵克水懸劑* (Thiodicarb)	0.3-1 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
75%硫敵克 可濕性粉劑* (Thiodicarb)	0.1-0.4 公斤	2,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。

\*延伸使用藥劑