

一百七十五、唇形科小葉菜類夜蛾類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
2.15%因滅汀乳劑* (Emamectin benzoate)	0.2-0.5 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止用藥。
2.15%因滅汀 水基乳劑* (Emamectin benzoate)	0.2-0.5 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止用藥。
19.2g/L因滅汀 乳劑* (Emamectin benzoate)	0.2-0.5 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止用藥。
5%因滅汀乳劑* (Emamectin benzoate)	0.1-0.2 公升	5,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止用藥。
5%因滅汀 水溶性粒劑* (Emamectin benzoate)	0.1-0.2 公斤	5,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止用藥。
10%賽滅寧 可濕性粉劑* (Cypermethrin)	0.1-0.3 公斤	3,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，水域禁用。
5%賽滅寧 可濕性粉劑* (Cypermethrin)	0.2-0.5 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，水域禁用。
5%賽滅寧 水基乳劑* (Cypermethrin)	0.2-0.5 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，水域禁用。
5%賽滅寧 微乳劑* (Cypermethrin)	0.2-0.5 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，水域禁用。
5%賽滅寧乳劑* (Cypermethrin)	0.2-0.5 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，水域禁用。

*延伸使用藥劑