

## 一百八十三、紫蘇夜蛾類

藥劑名稱	每公頃每 次施藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥方法	注意事項
18.4%剋安勃 水懸劑 (Chlorantraniliprole)	0.1-0.3 公升	2,500	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
35%剋安勃 水分散性粒劑 (Chlorantraniliprole)	0.1-0.2 公斤	5,000	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
5%賽滅寧乳劑 (Cypermethrin)	0.2-0.5 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，水域禁用。
5%賽滅寧 水基乳劑 (Cypermethrin)	0.2-0.5 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，水域禁用。
5%賽滅寧微乳劑 (Cypermethrin)	0.2-0.5 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，水域禁用。
10%賽滅寧 可濕性粉劑 (Cypermethrin)	0.1-0.3 公斤	3,000	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，水域禁用。
5%賽滅寧 可濕性粉劑 (Cypermethrin)	0.2-0.5 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，水域禁用。
40%納乃得 水溶性粒劑* (Methomyl)	0.2-0.5 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	採收前4天停止施藥。
25%納乃得 水溶性粉劑* (Methomyl)	0.3-0.9 公斤	800	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	採收前4天停止施藥。
40%納乃得 水溶性粉劑* (Methomyl)	0.2-0.5 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	採收前4天停止施藥。
40%納乃得 水溶性粉劑- 水溶性袋裝* (Methomyl)	0.2-0.5 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	採收前4天停止施藥。
50%培丹 水溶性粉劑* (Cartap)	0.3-0.8 公斤	1,000	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一 次。	採收前10天停止施藥。
5%可芬諾水懸劑* (Chromafenazide)	0.3-0.8 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	採收前14天停止施藥。

\*延伸使用藥劑

