

二十六、十字花科小葉菜類鱗翅目害蟲

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
5%賽滅寧乳劑 (Cypermethrin)	0.2-0.7 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，避免於開花期使用。
5%賽滅寧 水基乳劑 (Cypermethrin)	0.2-0.7 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，避免於開花期使用。
5%賽滅寧 微乳劑 (Cypermethrin)	0.2-0.7 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，避免於開花期使用。
10%賽滅寧 可濕性粉劑 (Cypermethrin)	0.1-0.3 公斤	3,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，避免於開花期使用。
5%賽滅寧 可濕性粉劑 (Cypermethrin)	0.2-0.7 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，避免於開花期使用。
5%可芬諾水懸劑* (Chromafenozide)	0.3-1 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前14天停止施藥。
54%鮎澤蘇力菌 NB-200 水分散性粒劑* (<i>Bacillus Thuringiensis</i> Subsp. Aizawai Strain NB-200)	0.3-1 公斤	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	

*延伸使用藥劑