

## 五十七、菊科蔬菜薊馬類

| 藥劑名稱   | 每公頃每<br>次施藥量  | 稀釋倍數<br>(倍) | 施藥方法                      | 注意事項       |
|--|---------------|-------------|---------------------------|------------|
| 1%賽洛寧<br>可濕性粉劑*<br>(Lambda-<br>cyhalothrin)    | 0.4-1.4<br>公斤 | 700         | 害蟲發生時開始施藥，必<br>要時隔7天施藥一次。 | 採收前9天停止施藥。 |
| 5%賽洛寧<br>水分散性粒劑*<br>(Lambda-<br>cyhalothrin)   | 0.1-0.3<br>公斤 | 3,500       | 害蟲發生時開始施藥，必<br>要時隔7天施藥一次。 | 採收前9天停止施藥。 |
| 2.8%賽洛寧乳劑*<br>(Lambda-<br>cyhalothrin)         | 0.1-0.5<br>公升 | 2,000       | 害蟲發生時開始施藥，必<br>要時隔7天施藥一次。 | 採收前9天停止施藥。 |
| 2.8%賽洛寧水懸劑*<br>(Lambda-<br>cyhalothrin)        | 0.1-0.5<br>公升 | 2,000       | 害蟲發生時開始施藥，必<br>要時隔7天施藥一次。 | 採收前9天停止施藥。 |
| 2.46%賽洛寧<br>膠囊懸著劑*<br>(Lambda-<br>cyhalothrin) | 0.1-0.5<br>公升 | 2,000       | 害蟲發生時開始施藥，必<br>要時隔7天施藥一次。 | 採收前9天停止施藥。 |
| 2.5%賽洛寧微乳劑*<br>(Lambda-<br>cyhalothrin)        | 0.1-0.5<br>公升 | 2,000       | 害蟲發生時開始施藥，必<br>要時隔7天施藥一次。 | 採收前9天停止施藥。 |

\*延伸使用藥劑