

五十八、菊科蔬菜夜蛾類

藥劑名稱	每公頃每 次施藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥方法	注意事項
50%培丹 水溶性粉劑* (Cartap)	0.3-1 公斤	1,000	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	1.小葉菜類及根菜類採收 前10天、包菜菜類採收 前6天停止施藥。 2.避免於開花期使用。
5%因滅汀 水溶性粒劑* (Emamectin benzoate)	0.1-0.2 公斤	5,000	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	1.小葉菜類採收前6天停 止施藥。 2.包葉菜類採收前9天停 止施藥。 3.根菜類採收前9天停止 施藥。
5%因滅汀乳劑* (Emamectin benzoate)	0.1-0.2 公升	5,000	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	1.小葉菜類採收前6天停 止施藥。 2.包葉菜類採收前9天停 止施藥。 3.根菜類採收前9天停止 施藥。
2.15%因滅汀乳劑* (Emamectin benzoate)	0.1-0.5 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	1.小葉菜類採收前6天停 止施藥。 2.包葉菜類採收前9天停 止施藥。 3.根菜類採收前9天停止 施藥。
2.15%因滅汀 水基乳劑* (Emamectin benzoate)	0.1-0.5 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	1.小葉菜類採收前6天停 止施藥。 2.包葉菜類採收前9天停 止施藥。 3.根菜類採收前9天停止 施藥。
19.2g/L因滅汀 乳劑* (Emamectin benzoate)	0.1-0.5 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	1.小葉菜類採收前6天停 止施藥。 2.包葉菜類採收前9天停 止施藥。 3.根菜類採收前9天停止 施藥。

*延伸使用藥劑