

六十一、菊科葉菜類切根蟲

菊科葉菜類：包括萵苣、茼蒿、紅鳳菜、結球萵苣等作物。

學名：*Agrotis ipsilon* (Hufnagel)

英名：Black cutworm

生活習性：

年發生5-6代，卵散產於葉上、地面土塊間或枯葉雜草上，呈饅頭狀。初齡幼蟲常匿居葉心部為害，二、三齡以後潛入土中，夜晚爬出土面切斷幼苗，拖入土中取食，或攀登植株上啃食莖葉。

危害特徵：幼株沿地際部整個被咬斷，形成缺株，莖上被啃食形成食痕，葉部被取食形成蟲孔。

防治方法：

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
5%免扶克粒劑* (Benfuracarb)	30公斤		定植前3天在畦上撒佈一次，並以鐵耙拌土約5公分。	限定植前施藥。
5%陶斯松粒劑* (Chlorpyrifos)	30公斤		種植前3天在畦上撒佈一次，並以鐵耙拌土約5公分，定植後一週再施藥一次。	採收前10天停止施藥。
0.5%芬化利粒劑* (Fenvalerate)	50公斤		種植前3天及定植後3天、10天各在畦上施藥一次，每次施藥後以鐵耙拌土約5公分。	施藥時必須戴手套。
3%加福松微粒劑* (Isoxathion)	50公斤		定植前3天在畦上撒佈一次，並以鐵耙拌土約5公分。	限定植前施藥。

*延伸使用藥劑