

六十四、菊科小葉菜類夜蛾類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
25%二福隆 可濕性粉劑* (Diflubenzuron)	0.4-0.6 公升	1,500	害蟲發生時每7天施一次。	1.採收前14天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，避免於 開花時使用。
18.4%剋安勃 水懸劑* (Chlorantraniliprole)	0.1-0.4 公升	2,500	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
35%剋安勃 水分散性粒劑* (Chlorantraniliprole)	0.1-0.2 公斤	5,000	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
58%乃力松乳劑* (Naled)	0.5-1 公斤	1,000	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前4天停止施藥。
10%賽滅寧 可濕性粉劑* (Cypermethrin)	0.1-0.3 公斤	3,000	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，避免開 花時使用。
5%賽滅寧 可濕性粉劑* (Cypermethrin)	0.2-0.7 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，避免開 花時使用。
5%賽滅寧 水基乳劑* (Cypermethrin)	0.2-0.7 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，避免開 花時使用。
5%賽滅寧微乳劑* (Cypermethrin)	0.2-0.7 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，避免開 花時使用。
5%賽滅寧乳劑* (Cypermethrin)	0.2-0.7 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，避免開 花時使用。

*延伸使用藥劑