

## 八十、茼蒿夜蛾類

【參照甜菜夜蛾；番茄夜蛾】

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
蘇力菌水分散性粒劑 32000 IU/mg ( <i>Bacillus thuringiensis</i> )	0.8-1.0 公斤	1,000	害蟲發生時開始施藥，每隔7天施藥一次。	
19.7%得芬諾水懸劑 (Tebufenozide)	0.4-0.6 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，每隔7天施藥一次。	採收前12天停止施藥。
10%克凡派水懸劑 (Chlorfenapyr)	0.8-1.0 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，每隔7天施藥一次。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.採收前12天停止施藥。</li> <li>2.具口服、皮膚及呼吸中等毒性。</li> <li>3.對鳥類、蜜蜂毒性高。</li> <li>4.對水生物劇毒，勿使用於「飲用水水源水質保護區」及「飲用水取水口一定距離內之地區」。</li> </ol>
70%得芬諾可濕性粉劑* (Tebufenozide)	0.11-0.17 公斤	7,000	害蟲發生時開始施藥，每隔7天施藥一次。	採收前12天停止施藥。

\*延伸使用藥劑