

八十一、艾草薊馬類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
1%賽洛寧 可濕性粉劑* (lambda-Cyhalothrin)	0.4-1.4 公斤	700	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前12天停止施藥。
5%賽洛寧 水分散性粒劑* (lambda-Cyhalothrin)	0.1-0.3 公斤	3,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前12天停止施藥。
2.8%賽洛寧乳劑* (lambda-Cyhalothrin)	0.1-0.5 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前12天停止施藥。
2.8%賽洛寧 水懸劑* (lambda-Cyhalothrin)	0.1-0.5 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前12天停止施藥。
2.46%賽洛寧 膠囊懸著劑* (lambda-Cyhalothrin)	0.1-0.5 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前12天停止施藥。
2.5%賽洛寧 微乳劑* (lambda-Cyhalothrin)	0.1-0.5 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前12天停止施藥。

*延伸使用藥劑