

## 八十八、蔥科小葉菜類鱗翅目害蟲

| 藥劑名稱                              | 每公頃每次施藥量      | 稀釋倍數(倍) | 施藥方法                  | 注意事項        |
|-----------------------------------|---------------|---------|-----------------------|-------------|
| 10%芬化利乳劑*<br>(Fenvalerate)        | 0.5-1.3<br>公升 | 1,500   | 害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 採收前14天停止施藥。 |
| 20%芬化利乳劑*<br>(Fenvalerate)        | 0.3-0.7<br>公升 | 3,000   | 害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 採收前14天停止施藥。 |
| 20%芬化利<br>水基乳劑*<br>(Fenvalerate)  | 0.3-0.7<br>公升 | 3,000   | 害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 採收前14天停止施藥。 |
| 20%芬化利<br>可濕性粉劑*<br>(Fenvalerate) | 0.3-0.7<br>公斤 | 3,000   | 害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 採收前14天停止施藥。 |
| 5%芬化利乳劑*<br>(Fenvalerate)         | 1.1-2.7<br>公升 | 750     | 害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 採收前14天停止施藥。 |
| 34%硫敵克水懸劑*<br>(Thiodicarb)        | 0.8-2<br>公升   | 1,000   | 害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 採收前6天停止施藥。  |
| 75%硫敵克<br>可濕性粉劑*<br>(Thiodicarb)  | 0.3-0.8<br>公斤 | 2,500   | 害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 採收前6天停止施藥。  |

\*延伸使用藥劑