

### 九十三、蔥科小葉菜類夜蛾類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
18.4%剋安勃水懸劑 (Chlorantraniliprole)	0.3-0.8 公升	2,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前9天停止施藥。 2.具呼吸中等毒性。 3.對水生物具毒性，勿使用於「飲用水水源水質保護區」及「飲用水取水口一定距離內之地區」。
35%剋安勃水分散性粒劑 (Chlorantraniliprole)	0.2-0.4 公斤	5,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前9天停止施藥。 2.具呼吸中等毒性。 3.對水生物具毒性，勿使用於「飲用水水源水質保護區」及「飲用水取水口一定距離內之地區」。
14.5%因得克水懸劑* (Indoxacarb)	0.4-1 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
15.8%因得克乳劑* (Indoxacarb)	0.4-1 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
25%二福隆可濕性粉劑* (Diflubenzuron)	0.4-0.6 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前14天停止施藥。
40%納乃得水溶性粒劑* (Methomyl)	0.5-1.3 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
25%納乃得水溶性粉劑* (Methomyl)	1-2.5 公斤	800	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
40%納乃得水溶性粉劑* (Methomyl)	0.5-1.3 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
40%納乃得水溶性粉劑-水溶性袋裝* (Methomyl)	0.5-1.3 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
50%培丹水溶性粉劑* (Cartap hydrochloride)	0.8-2 公斤	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
19.7%得芬諾水懸劑* (Tebufenozide)	0.4-1 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
4.4%祿芬隆乳劑* (Lufenuron)	0.5-1.3 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。

藥劑名稱	每公頃每 次施藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥方法	注意事項
5%可芬諾水懸劑* (Chromafenazide)	0.8-2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前18天停止施藥。
10%賽滅寧 可濕性粉劑* (Cypermethrin)	0.3-0.7 公斤	3,000	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，水域禁用。
5%賽滅寧 可濕性粉劑* (Cypermethrin)	0.5-1.3 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，水域禁用。
5%賽滅寧 水基乳劑* (Cypermethrin)	0.5-1.3 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，水域禁用。
5%賽滅寧微乳劑* (Cypermethrin)	0.5-1.3 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，水域禁用。
5%賽滅寧乳劑* (Cypermethrin)	0.5-1.3 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，水域禁用。
14.5%因得克 水懸劑* (Indoxacarb)	0.5-0.6 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
5%因滅汀 水溶性粒劑* (Emamectin benzoate)	0.2公斤	5,000	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	1.採收前9天停止施藥。 2.具嚴重眼刺激性及中度 皮膚刺激性，應注意防護 措施。 3.對水生物具毒性，勿使用 於「飲用水水源水質保護 區」及「飲用水取水口一 定距離之地區」。
2.15%因滅汀乳劑* (Emamectin benzoate)	0.6-0.8 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	1.採收前9天停止施藥。 2.具中度皮膚刺激性，強眼 刺激性。 3.對鳥類具神經毒性，對蜜 蜂劇毒性，對水生物具毒 性，勿使用於「飲用水水 源水質保護區」及「飲用 水取水口一定距離內之 地區」。
2.15%因滅汀 水基乳劑* (Emamectin benzoate)	0.6-0.8 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	1.採收前9天停止施藥。 2.具中度皮膚刺激性，強眼 刺激性。 3.對鳥類具神經毒性，對蜜 蜂劇毒性，對水生物具毒 性，勿使用於「飲用水水 源水質保護區」及「飲用 水取水口一定距離內之 地區」。
70%得芬諾 可濕性粉劑* (Tebufenozide)	0.11-0.29 公斤	7,000	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。

\*延伸使用藥劑

