

十六、蘆筍金花蟲類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
50%培丹 水溶性粉劑* (Cartap hydrochloride)	1-1.2 公斤	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥
5%可芬諾水懸劑* (Chromafenazide)	1-1.2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前18天停止施藥。
40%納乃得 水溶性粒劑* (Methomyl)	0.7-0.8 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
25%納乃得 水溶性粉劑* (Methomyl)	1.3-1.5 公斤	800	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
40%納乃得 水溶性粉劑* (Methomyl)	0.7-0.8 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
40%納乃得 水溶性粉劑- 水溶性袋裝* (Methomyl)	0.7-0.8 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
25%二福隆 可濕性粉劑* (Diflubenzuron)	0.5-0.8 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前35天停止施藥。
20%亞滅培 水溶性粉劑* (Acetamiprid)	0.5-0.6 公斤	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
20%達特南 水溶性粒劑* (Dinotefuran)	0.4-0.5 公斤	3,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
43%佈飛松乳劑* (Profenofos)	0.8-1 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前12天停止施藥。
50%培丹 水溶性粉劑* (Cartap hydrochloride)	0.8-1 公斤	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥

*延伸使用藥劑

