

二十二、竹捲葉蛾類

綠竹筍捲葉蛾

學名：*Coclebotys coclesalis* (Walker)

英名：Bamboo leaf roller

危害作物：綠竹、烏腳綠竹、麻竹、刺竹、桂竹、竹變、金絲竹、梨果竹、日本矢竹。

生活習性：

捲葉蛾成蟲具強趨光性，多趨向光線充足之處，於上部新生葉片背面產卵，幼蟲淡黃色，頭褐色，會在新葉上吐絲，包裹成一繭包，幼蟲便躲在其內取食葉肉危害，嚴重時全株新葉大多捲成筒狀之奇景，老熟幼蟲在捲葉內化蛹，族群發生較不普遍，通常呈區域性分佈。危害特徵：

竹捲葉蛾成蟲於新生葉片背面產卵，孵化的幼蟲會選擇尚未展開的第一片心葉，在其上吐絲綴合新葉，並成蟲苞，幼蟲則躲在其內取食葉肉，將葉片打開可見許多蟲糞，幼蟲危害到某一程度便會遷移，再尋找新葉危害，嚴重時整株新葉多呈筒狀，影響生長。幼蟲於5~10月發生較嚴重。

防治方法：

幼蟲潛於捲內，藥劑不易噴及蟲體，在蟲害發初期即行噴藥，噴佈於葉部。密度高之地區，清園時清除被害葉，燒燬蟲苞內之幼蟲或蛹。

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
5.7%賽扶寧乳劑* (Cyfluthrin)	3-4公升	250	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。

*延伸使用藥劑