

## 二十三、薑 鱗 翅 目 害 蟲

藥劑名稱	每公頃每 次施藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥方法	注意事項
50%培丹 水溶性粉劑 (Cartap hydrochloride)	0.9-1.2 公斤	1,000	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	薑採收前10天、薑黃採收 前14天停止施藥。
40%納乃得 水溶性粒劑* (Methomyl)	0.6-0.8 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	薑採收前6天、薑黃採收前 21天停止施藥。
25%納乃得 水溶性粉劑* (Methomyl)	1.1-1.5 公斤	800	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	薑採收前6天、薑黃採收前 21天停止施藥。
40%納乃得 水溶性粉劑* (Methomyl)	0.6-0.8 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	薑採收前6天、薑黃採收前 21天停止施藥。
40%納乃得 水溶性粉劑- 水溶性袋裝* (Methomyl)	0.6-0.8 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	薑採收前6天、薑黃採收前 21天停止施藥。
10%芬化利乳劑* (Fenvalerate)	0.6-0.8 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	採收前14天停止施藥。
20%芬化利乳劑* (Fenvalerate)	0.3-0.4 公升	3,000	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	採收前14天停止施藥。
20%芬化利 水基乳劑* (Fenvalerate)	0.3-0.4 公升	3,000	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	採收前14天停止施藥。
20%芬化利 可濕性粉劑* (Fenvalerate)	0.3-0.4 公升	3,000	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	採收前14天停止施藥。
5%芬化利乳劑* (Fenvalerate)	1.2-1.6 公升	750	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	採收前14天停止施藥。

\*延伸使用藥劑

