

## 二十八、薑夜蛾類

藥劑名稱	每公頃每 次施藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥方法	注意事項
5%賽滅寧乳劑 (Cypermethrin)	0.6-0.8 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，水域禁用。
5%賽滅寧 水基乳劑 (Cypermethrin)	0.6-0.8 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，水域禁用。
5%賽滅寧微乳劑 (Cypermethrin)	0.6-0.8 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，水域禁用。
10%賽滅寧 可濕性粉劑 (Cypermethrin)	0.6-0.8 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，水域禁用。
5%賽滅寧 可濕性粉劑 (Cypermethrin)	0.6-0.8 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，水域禁用。
20%依芬寧 可濕性粉劑* (Etofenprox)	0.6-0.8 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前14天停止施藥。
10%依芬寧乳劑* (Etofenprox)	1.2-1.6 公升	750	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前14天停止施藥。
100g/L諾伐隆 水分散性乳劑* (Novaluron)	0.6-0.8 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前21天停止施藥。
58%乃力松乳劑* (Naled)	0.5-1 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前4天停止施藥。
25%二福隆 可濕性粉劑* (Diflubenzuron)	0.5-0.8 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前35天停止施藥。
34%硫敵克水懸劑* (Thiodicarb)	0.9-1.2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
75%硫敵克 可濕性粉劑* (Thiodicarb)	0.4-0.5 公斤	2,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
18.4%剋安勃 水懸劑* (Chlorantraniliprole)	0.4-0.5 公升	2,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前14天停止施藥。
35%剋安勃 水分散性粒劑* (Chlorantraniliprole)	0.2公斤	5,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前14天停止施藥。

\*延伸使用藥劑

