

### 三十六、蔥科根菜類薊馬類

| 藥劑名稱                                       | 每公頃每<br>次施藥量  | 稀釋倍數<br>(倍) | 施藥方法                      | 注意事項        |
|--|---------------|-------------|---------------------------|-------------|
| 1%賽洛寧<br>可濕性粉劑*<br>(lambda-Cyhalothrin)    | 1.1-2.9<br>公斤 | 700         | 害蟲發生時開始施藥，必<br>要時隔7天施藥一次。 | 採收前9天停止施藥。  |
| 5%賽洛寧<br>水分散性粒劑*<br>(lambda-Cyhalothrin)   | 0.2-0.6<br>公斤 | 3,500       | 害蟲發生時開始施藥，必<br>要時隔7天施藥一次。 | 採收前9天停止施藥。  |
| 2.8%賽洛寧乳劑*<br>(lambda-Cyhalothrin)         | 0.4-1<br>公升   | 2,000       | 害蟲發生時開始施藥，必<br>要時隔7天施藥一次。 | 採收前9天停止施藥。  |
| 2.8%賽洛寧<br>水懸劑*<br>(lambda-Cyhalothrin)    | 0.4-1<br>公升   | 2,000       | 害蟲發生時開始施藥，必<br>要時隔7天施藥一次。 | 採收前9天停止施藥。  |
| 2.46%賽洛寧<br>膠囊懸著液*<br>(lambda-Cyhalothrin) | 0.4-1<br>公升   | 2,000       | 害蟲發生時開始施藥，必<br>要時隔7天施藥一次。 | 採收前9天停止施藥。  |
| 2.5%賽洛寧<br>微乳劑*<br>(lambda-Cyhalothrin)    | 0.4-1<br>公升   | 2,000       | 害蟲發生時開始施藥，必<br>要時隔7天施藥一次。 | 採收前9天停止施藥。  |
| 43%佈飛松乳劑*<br>(Profenofos)                  | 1-2.5<br>公升   | 800         | 害蟲發生時開始施藥，必<br>要時隔7天施藥一次。 | 採收前10天停止施藥。 |
| 500g/L佈飛松<br>(50%w/v)乳劑*<br>(Profenofos)   | 1-2.5<br>公升   | 800         | 害蟲發生時開始施藥，必<br>要時隔7天施藥一次。 | 採收前10天停止施藥。 |
| 2.4%第滅寧水懸劑*<br>(Deltamethrin)              | 0.8-1.2<br>公升 | 1,000       | 害蟲發生時開始施藥，必<br>要時隔7天施藥一次。 | 採收前6天停止施藥。  |
| 2.8%第滅寧乳劑*<br>(Deltamethrin)               | 0.8-1.2<br>公升 | 1,000       | 害蟲發生時開始施藥，必<br>要時隔7天施藥一次。 | 採收前6天停止施藥。  |
| 2.8%第滅寧<br>水基乳劑*<br>(Deltamethrin)         | 0.8-1.2<br>公升 | 1,000       | 害蟲發生時開始施藥，必<br>要時隔7天施藥一次。 | 採收前6天停止施藥。  |
| 25%福化利乳劑*<br>(tau-Fluvalinate)             | 0.3-0.7<br>公升 | 3,000       | 害蟲發生時開始施藥，必<br>要時隔7天施藥一次。 | 採收前7天停止施藥。  |
| 2.5%賽洛寧<br>微乳劑*<br>(lambda-Cyhalothrin)    | 0.4-1<br>公升   | 2,000       | 害蟲發生時開始施藥，必<br>要時隔7天施藥一次。 | 採收前7天停止施藥。  |
| 2.46%賽洛寧<br>膠囊懸著液*<br>(lambda-Cyhalothrin) | 0.4-1<br>公升   | 2,000       | 害蟲發生時開始施藥，必<br>要時隔7天施藥一次。 | 採收前7天停止施藥。  |
| 2.8%賽洛寧乳劑*<br>(lambda-Cyhalothrin)         | 0.4-1<br>公升   | 2,000       | 害蟲發生時開始施藥，必<br>要時隔7天施藥一次。 | 採收前7天停止施藥。  |

| 藥劑名稱                                   | 每公頃每<br>次施藥量  | 稀釋倍數<br>(倍) | 施藥方法                      | 注意事項                                   |
|--|---------------|-------------|---------------------------|--|
| 2.9%貝他-賽扶寧<br>乳劑*<br>(Beta-cyfluthrin) | 0.5-1.3<br>公升 | 1,500       | 害蟲發生時開始施藥，必<br>要時隔7天施藥一次。 | 採收前9天停止施藥。                             |
| 9.6%益達胺<br>水懸劑*<br>(Imidacloprid)      | 0.4-1<br>公升   | 2,000       | 害蟲發生時開始施藥，必<br>要時隔7天施藥一次。 | 1.採收前9天停止施藥。<br>2.避免施用於弱勢苗，以免<br>發生藥害。 |
| 9.6%益達胺溶液*<br>(Imidacloprid)           | 0.4-1<br>公升   | 2,000       | 害蟲發生時開始施藥，必<br>要時隔7天施藥一次。 | 1.採收前9天停止施藥。<br>2.避免施用於弱勢苗，以免<br>發生藥害。 |
| 18.2%益達胺<br>水懸劑*<br>(Imidacloprid)     | 0.2-0.5<br>公升 | 4,000       | 害蟲發生時開始施藥，必<br>要時隔7天施藥一次。 | 1.採收前9天停止施藥。<br>2.避免施用於弱勢苗，以免<br>發生藥害。 |
| 28.8%益達胺<br>溶液*<br>(Imidacloprid)      | 0.1-0.3<br>公升 | 6,000       | 害蟲發生時開始施藥，必<br>要時隔7天施藥一次。 | 1.採收前9天停止施藥。<br>2.避免施用於弱勢苗，以免<br>發生藥害。 |

\*延伸使用藥劑