

三十七、蔥科根菜類夜蛾類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
18.4%剋安勃水懸劑 (Chlorantraniliprole)	0.3-0.8 公升	2,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前14天停止施藥。
35%剋安勃水分散性粒劑 (Chlorantraniliprole)	0.2-0.4 公斤	5,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前14天停止施藥。
5%賽滅寧乳劑 (Cypermethrin)	0.5-1.3 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，水域禁用。
5%賽滅寧水基乳劑 (Cypermethrin)	0.5-1.3 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，水域禁用。
5%賽滅寧微乳劑 (Cypermethrin)	0.5-1.3 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，水域禁用。
10%賽滅寧可濕性粉劑 (Cypermethrin)	0.3-0.7 公斤	3,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，水域禁用。
5%賽滅寧可濕性粉劑 (Cypermethrin)	0.5-1.3 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，水域禁用。
40%納乃得水溶性粒劑* (Methomyl)	0.5-1.3 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
25%納乃得水溶性粉劑* (Methomyl)	1-2.5 公斤	800	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
40%納乃得水溶性粉劑* (Methomyl)	0.5-1.3 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
40%納乃得水溶性粉劑-水溶性袋裝* (Methomyl)	0.5-1.3 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
50%培丹水溶性粉劑* (Cartap hydrochloride)	0.8-2 公斤	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥
14.5%因得克水懸劑* (Indoxacarb)	0.4-1 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
15.8%因得克乳劑* (Indoxacarb)	0.4-1 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。

藥劑名稱	每公頃每 次施藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥方法	注意事項
25%二福隆 可濕性粉劑* (Diflubenzuron)	0.4-0.6 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前35天停止施藥。
19.7%得芬諾 水懸劑* (Tebufenozide)	0.4-1 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
4.4%祿芬隆乳劑* (Lufenuron)	0.5-1.3 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
5%可芬諾水懸劑* (Chromafenazide)	0.8-2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前18天停止施藥。
70%得芬諾 可濕性粉劑* (Tebufenozide)	0.11-0.29 公斤	7,000	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。

*延伸使用藥劑