

四十七、胡蘿蔔夜蛾類

【參照甜菜夜蛾；番茄夜蛾】

夜蛾類：包括斜紋夜蛾、甜菜夜蛾、番茄夜蛾、擬尺蠖等害蟲。

防治方法：

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
5%賽滅寧乳劑 (Cypermethrin)	0.2-2 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，水域禁用。
5%賽滅寧水基乳劑 (Cypermethrin)	0.2-2 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，水域禁用。
5%賽滅寧微乳劑 (Cypermethrin)	0.2-2 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，水域禁用。
10%賽滅寧可濕性粉劑 (Cypermethrin)	0.1-1 公斤	3,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，水域禁用。
5%賽滅寧可濕性粉劑 (Cypermethrin)	0.2-2 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，水域禁用。
10%克凡派水懸劑 (Chlorfenapyr)	0.8-1.0 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，每隔7天施藥一次。	1.採收前3天停止施藥。 2.具口服、皮膚及呼吸中等毒性。 3.對鳥類、蜜蜂毒性高。 4.對水生物劇毒，勿使用於「飲用水水源水質保護區」及「飲用水取水口一定距離內之地區」。
48.1%蘇力菌水分散性粒劑 (<i>Bacillus thuringiensis</i>)	0.8-1.0 公斤	1,000	害蟲發生時開始施藥，每隔7天施藥一次。	
2.8%賽洛寧乳劑 (Lambda-cyhalothrin)	0.4-0.6 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，每隔7天施藥一次。	1.採收前3天停止施藥。 2.具呼吸中等毒、中度眼刺激性及皮膚過敏性。 3.對蜜蜂具毒性。 4.對水生物劇毒，勿使用於「飲用水水源水質保護區」及「飲用水取水口一定距離內之地區」。
2.8%賽洛寧水懸劑 (Lambda-cyhalothrin)	0.4-0.6 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，每隔7天施藥一次。	1.採收前3天停止施藥。 2.具呼吸中等毒、中度眼刺激性及皮膚過敏性。 3.對蜜蜂具毒性。 4.對水生物劇毒，勿使用於「飲用水水源水質保護區」及「飲用水取水口一定距離內之地區」。

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
20%芬化利水基乳劑* (Fenvalerate)	0.15-0.25公升	3,000	害蟲發生時開始施藥，每隔7天施藥一次。	採收前14天停止施藥。
20%芬化利乳劑* (Fenvalerate)	0.15-0.25公升	3,000	害蟲發生時開始施藥，每隔7天施藥一次。	採收前14天停止施藥。
20%芬化利可濕性粉劑* (Fenvalerate)		5,000	害蟲發生時開始施藥，每隔7至10天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
5%芬化利乳劑* (Fenvalerate)	0.5公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，每隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
2.46%賽洛寧膠囊懸著液* (lambda-Cyhalothrin)	0.4-0.6公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，每隔7天施藥一次。	採收前3天停止施藥。
2.5%賽洛寧微乳劑* (lambda-Cyhalothrin)	0.4-0.6公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，每隔7天施藥一次。	採收前3天停止施藥。
75%硫敵克可濕性粉劑* (Thiodicarb)	0.3-0.5公斤	3,000	害蟲發生時開始施藥，每隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.避免與石灰硫磺合劑、波爾多液、重金屬系藥劑混用。
18.4%剋安勃水懸劑* (Chlorantraniliprole)	0.1-1.2公升	2,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前14天停止施藥。
35%剋安勃水分散性粒劑* (Chlorantraniliprole)	0.1-0.6公升	5,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前14天停止施藥。
33%佈飛百滅寧乳劑* (Profenofos + Permethrin)	0.8-1公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前12天停止施藥。
50%培丹水溶性粉劑* (Cartap hydrochloride)	0.3-3公斤	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
40%納乃得水溶性粒劑* (Methomyl)	0.2-2公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
25%納乃得水溶性粉劑* (Methomyl)	0.3-3.8公斤	800	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
40%納乃得水溶性粉劑* (Methomyl)	0.2-2公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
40%納乃得 水溶性粉劑- 水溶性袋裝* (Methomyl)	0.2-2 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。

*延伸使用藥劑

TACTRI