

### 五十三、菊科根菜類薊馬類

| 藥劑名稱                                 | 每公頃每次施藥量        | 稀釋倍數(倍) | 施藥方法                   | 注意事項  |
|--------------------------------------|-----------------|---------|------------------------|---|
| 40%納乃得水溶性粉劑*<br>(Methomyl)           | 0.2-0.7<br>公斤   | 1,500   | 害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。  | 採收前6天停止施藥。  |
| 40%納乃得水溶性粒劑*<br>(Methomyl)           | 0.2-0.7<br>公斤   | 1,500   | 害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。  | 採收前6天停止施藥。  |
| 40%納乃得水溶性粉劑-<br>水溶性袋裝*<br>(Methomyl) | 0.2-0.7<br>公斤   | 1,500   | 害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。  | 採收前6天停止施藥。  |
| 25%納乃得水溶性粉劑*<br>(Methomyl)           | 0.3-1.3<br>公斤   | 800     | 害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。  | 採收前6天停止施藥。  |
| 11.7%賜諾特水懸劑*<br>(Spinetoram)         | 0.03-0.1<br>公升  | 8,000   | 害蟲發生時施藥一次，必要時隔7天再施藥一次。 | 採收前6天停止施藥。  |
| 5.87%賜諾特水懸劑*<br>(Spinetoram)         | 0.06-0.2<br>公升  | 4,000   | 害蟲發生時施藥一次，必要時隔7天再施藥一次。 | 採收前6天停止施藥。  |
| 2.5%賜諾殺水懸劑*<br>(Spinosad)            | 0.3-1<br>公升     | 1,000   | 害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。  | 1.採收前6天停止施藥。<br>2.對蜜蜂毒性高，避免於作物開花時期使用。<br>3.對水生物具中等毒性，勿使用於「自來水水質水量保護區、飲用水水源水質保護區」及「飲用水取水口一定距離之地區」。 |
| 11.6%賜諾殺水懸劑*<br>(Spinosad)           | 0.1-0.2<br>公升   | 4,500   | 害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。  | 1.採收前6天停止施藥。<br>2.對蜜蜂毒性高，避免於作物開花時期使用。<br>3.對水生物具中等毒性，勿使用於「自來水水質水量保護區、飲用水水源水質保護區」及「飲用水取水口一定距離之地區」。 |
| 80%賜諾殺可濕性粉劑*<br>(Spinosad)           | 0.01-0.03<br>公斤 | 32,000  | 害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。  | 1.採收前6天停止施藥。<br>2.對蜜蜂毒性高，避免於作物開花時期使用。<br>3.對水生物具中等毒性，勿使用於「自來水水質水量保護區、飲用水水源水質保護區」及「飲用水取水口一定距離之地區」。 |

| 藥劑名稱                                   | 每公頃每次施藥量      | 稀釋倍數(倍) | 施藥方法                  | 注意事項                               |
|--|---------------|---------|-----------------------|------------------------------------|
| 20%亞滅培水溶性粉劑*<br>(Acetamiprid)          | 0.1-0.3<br>公斤 | 4,000   | 害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 採收前6天停止施藥。                         |
| 2.8%賽洛寧乳劑*<br>(lambda-Cyhalothrin)     | 0.1-0.5<br>公升 | 2,000   | 害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 採收前9天停止施藥。                         |
| 2.5%賽洛寧微乳劑*<br>(lambda-Cyhalothrin)    | 0.1-0.5<br>公升 | 2,000   | 害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 採收前9天停止施藥。                         |
| 2.46%賽洛寧膠囊懸著液*<br>(lambda-Cyhalothrin) | 0.1-0.5<br>公升 | 2,000   | 害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 採收前9天停止施藥。                         |
| 9.6%益達胺水懸劑*<br>(Imidacloprid)          | 0.2-0.7<br>公升 | 1,500   | 害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 採收前9天停止施藥。                         |
| 9.6%益達胺溶液*<br>(Imidacloprid)           | 0.2-0.7<br>公升 | 1,500   | 害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 採收前9天停止施藥。                         |
| 18.2%益達胺水懸劑*<br>(Imidacloprid)         | 0.1-0.3<br>公升 | 3,000   | 害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 採收前9天停止施藥。                         |
| 28.8%益達胺溶液*<br>(Imidacloprid)          | 0.1-0.2<br>公升 | 4,500   | 害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 採收前9天停止施藥。                         |
| 43%佈飛松乳劑*<br>(Profenofos)              | 1.5-2.0<br>公升 | 800     | 害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 1.採收前10天停止施藥。<br>2.對蜜蜂具毒性，避免開花時使用。 |

\*延伸使用藥劑