

五十九、牛蒡蚜蟲類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
20%亞滅培水溶性粉劑* (Acetamiprid)	0.04-0.2 公斤	6,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
18.2%益達胺水懸劑* (Imidacloprid)	0.03-0.1 公升	8,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
5%賽扶寧水基乳劑* (Cyfluthrin)	0.1-0.5 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
5.7%賽扶寧乳劑* (Cyfluthrin)	0.1-0.5 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
50%培丹水溶性粉劑* (Cartap hydrochloride)	0.3-1 公斤	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
31.6%護賽寧乳劑* (Flucythrinate)	0.03-0.1 公升	8,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前21天停止施藥。
5%護賽寧溶液* (Flucythrinate)	0.2-0.7 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前21天停止施藥。
50%馬拉松乳劑* (Malathion)	0.2-0.7 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前7天停止施藥。
20%達特南水溶性粒劑* (Dinotefuran)	0.3-0.5 公斤	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。

*延伸使用藥劑