

## 六十一、牛蒡夜蛾類

【參照甜菜夜蛾；番茄夜蛾】

夜蛾類：包括斜紋夜蛾、甜菜夜蛾、番茄夜蛾、擬尺蠖等害蟲。

防治方法：

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
5%克福隆乳劑 (Chlorfluazuron)	0.8-1.0 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，每隔7天施藥一次。	1.採收前3天停止施藥。 2.具眼刺激性。
20%芬化利水基乳劑* (Fenvalerate)	0.15- 0.25公升	3,000	害蟲發生時開始施藥，每隔7天施藥一次。	採收前14天停止施藥。
20%芬化利乳劑* (Fenvalerate)	0.15- 0.25公升	3,000	害蟲發生時開始施藥，每隔7天施藥一次。	採收前14天停止施藥。
20%芬化利可濕性粉劑* (Fenvalerate)		5,000	害蟲發生時開始施藥，每隔7至10天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
5%芬化利乳劑* (Fenvalerate)	0.5公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，每隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
2.46%賽洛寧膠囊懸著液* (lambda-Cyhalothrin)	0.4-0.6 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，每隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
2.5%賽洛寧微乳劑* (lambda-Cyhalothrin)	0.4-0.6 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，每隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。

\*延伸使用藥劑