

七十五、菱角鱗翅目害蟲

| 藥劑名稱 | 每公頃每 次施藥量 | 稀釋倍數 (倍) | 施藥方法 | 注意事項 |
|-----------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|-------------|
| 10%芬化利乳劑* (Fenvalerate) | 0.6-0.8 公升 | 1,500 | 害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。 | 採收前14天停止施藥。 |
| 20%芬化利乳劑* (Fenvalerate) | 0.3-0.4 公升 | 3,000 | 害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。 | 採收前14天停止施藥。 |
| 20%芬化利 水基乳劑* (Fenvalerate) | 0.3-0.4 公升 | 3,000 | 害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。 | 採收前14天停止施藥。 |
| 20%芬化利 可濕性粉劑* (Fenvalerate) | 0.3-0.4 公斤 | 3,000 | 害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。 | 採收前14天停止施藥。 |
| 5%芬化利乳劑* (Fenvalerate) | 1.2-1.6 公升 | 750 | 害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。 | 採收前14天停止施藥。 |
| 34%硫敵克水懸劑* (Thiodicarb) | 0.9-1.2 公升 | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。 | 採收前6天停止施藥。 |
| 75%硫敵克 可濕性粉劑* (Thiodicarb) | 0.4-0.5 公斤 | 2,500 | 害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。 | 採收前6天停止施藥。 |

*延伸使用藥劑