

七十六、菱角夜蛾類、天蛾類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
40%納乃得 水溶性粒劑* (Methomyl)	0.6-0.8 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.僅防治夜蛾類。 2.採收前6天停止施藥。
25%納乃得 水溶性粉劑* (Methomyl)	1.1-1.5 公斤	800	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.僅防治夜蛾類。 2.採收前6天停止施藥。
40%納乃得 水溶性粉劑* (Methomyl)	0.6-0.8 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.僅防治夜蛾類。 2.採收前6天停止施藥。
40%納乃得 水溶性粉劑- 水溶性袋裝* (Methomyl)	0.6-0.8 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.僅防治夜蛾類。 2.採收前6天停止施藥。
5%可芬諾水懸劑* (Chromafenazide)	0.9-1.2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.僅防治夜蛾類。 2.採收前18天停止施藥。
5%芬化利乳劑* (Fenvalerate)	1.2-1.6 公升	750	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前14天停止施藥。

*延伸使用藥劑

TAC